

Meditonsin®

DAMLA

Karışım

7 aydan itibaren bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde kullanmak için

Etken maddeler: Aconitinum D5, Atropinum sulfuricum D5 ve Mercurius cyanatus D8

Bu ilacı kullanmadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. Bu ilacı daima bu kullanma talimatında tarif edildiği gibi ve doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarına aynen uyarak kullanınız.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen eczacınıza danışınız.
- Eğer yan etkiler ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Bu husus bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen yan etkiler için de geçerlidir. Bakınız Bölüm 4.
- Eğer 3 gün sonra kendinizi daha iyi hissetmezseniz ve hatta daha da kötü hissederseniz, doktorunuza başvurunuz.

Bu kullanma talimatında:

- Meditonsin® Damla nedir ve ne için kullanılır?
- Meditonsin® Damla'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
- Meditonsin® Damla nasıl kullanılır?
- Olası yan etkiler nelerdir?
- Meditonsin® Damla'nın saklanması
- Ambalaj içeriği ve diğer bilgiler

Başlıkları yer almaktadır.

1. Meditonsin® Damla nedir ve ne için kullanılır?

Meditonsin® Damla, soğuk algınlığı hastalıkları için homeopatik bir ilaçtır.

Uygulama alanı

Uygulama alanları, homeopatik ilacın profiline göre değişir.

Kapsamı:

Akut boğaz, burun ve yutak bölgesi iltihapları.

Eğer 3 gün sonra kendinizi daha iyi hissetmezseniz hatta daha da kötü hissederseniz, doktorunuza başvurunuz.

2. Meditonsin® Damla'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Aşağıdaki hallerde Meditonsin® Damla alınmamalıdır

- Aconitinum D5, Atropinum sulfuricum D5 veya Mercurius cyanatus D8'e karşı alerjiniz varsa.

- Eğer alkoliksensiz (Meditonsin® damlaları hacim bazında %6 alkol içerir).

Uyarılar ve önlemler

Meditonsin® Damla'yı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza görüşünüz.

7 aydan daha küçük bebeklerde kullanılması yönünde yeterli kaydedilmiş bilgi bulunmamaktadır. O nedenle, Meditonsin® bu hasta grubunda kullanılmamalıdır.

7-12 aylık bebeklerde Meditonsin® Damla sadece doktorla görüşülerek kullanılmalıdır.

Devam eden, belirsiz veya yeni baş gösteren şikayetlerde ya da nefes darlığı veya ateş görüldüğünde doktora başvurulmalıdır.

Meditonsin® Damla'nın diğer ilaçlarla birlikte kullanımı:

Başka ilaçlar kullanıyorsanız ya da kısa süre önce kullandıysanız ya da kullanmayı düşünüyorsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Başka maddelerle etkileşimi bilinmemektedir.

Meditonsin® Damla'nın besinlerle, içeceklerle ve alkolle beraber kullanılması

Homeopatik ilacın etkisi yaşam biçimindeki genel zarar verici faktörler ve uyarıcı ve keyif verici maddeler tarafından olumsuz etkilenebilir.

Hamilelik, emzirme ve çocuk yapma/doğurganlık

Hamileyseniz veya emziriyorsanız ya da hamile olduğunuz tahmin ediyor veya hamileliği planlıyorsanız, ilacı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Araç ve makine kullanımı

Meditonsin® Damla'nın araç ve makine kullanma kabiliyeti üzerinde etkisi yoktur.

3. Meditonsin® Damla nasıl kullanılır?

Bu ilacı her zaman tam olarak kullanma talimatında tarif edildiği gibi ve doktorunuz veya eczacınızla kararlaştırdığınız şekilde alınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Yetişkinler, çocuklar ve 12 yaş ve üzeri gençler için geçerli kural:

Akut durumlarda yetişkinler ve 12 yaş ve üzeri gençler, günde en fazla 6 defa olmak üzere, yarım veya bir saatte bir 5'er damla alırlar.

7 ay - 1 yaş arası bebekler için geçerli kural: Doktor ile görüşüldükten sonra günde en fazla 4 defa olmak üzere 1'er damla kullanılır.

1 yaş üzeri çocuklar için geçerli kural: Günde en fazla 6 defa olmak üzere 1'er damla kullanılır.

6-12 yaş arası çocuklar için geçerli kural: Günde en fazla 6 defa olmak üzere 1-2'şer damla (günde en fazla 11 damla) kullanılır.

Uygulama şekli

Damlalar inceltilmeden alınır ve bir süre ağızda tutulur. Kullanım ögün saatlerinden bağımsız gerçekleşir.

Uygulama süresi

Meditonsin® Damla mümkün olduğu kadar erken alınmalıdır.

Bir haftayı aşan kullanımlar için mutlaka önce doktora veya homeopati konusunda deneyimi olan bir terapistle danışılmalıdır.

Eğer Meditonsin® Damla'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuza veya eczacınıza ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Meditonsin® Damla kullandıysanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla Meditonsin® Damla kullandıysanız, içerik maddelerinden dolayı bulantı, kusma ve ishal görülebilir. Bu gibi durumlarda derhal doktora başvurunuz.

Meditonsin® Damla'yı kullanmayı unuttursanız

Eğer bir önceki dozu almayı unuttursanız, çift doz almayınız, bunun yerine damla dozunu yukarıda belirtildiği gibi almayı sürdürünüz.

Eğer Meditonsin® Damla'yı almayı keserseniz

Hastalık belirtileri yeniden baş gösterebilir.

İlacın alınmasıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza başvurunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlarda olduğu gibi bu ilacın da yan etkileri olabilir, ancak bunlar her hastada görülmeyebilir.

Olası yan etkiler

Meditonsin® Damla kullanıldıktan sonra salya akması görülebilir; o zaman ilaç bırakılmalıdır.

Aşırı hassasiyet reaksiyonları görülebilir (örneğin kaşıntı ve cilt tahrişi). Bu durumda ilaç bırakılmalıdır.

Not:

Homeopatik ilaçlar alınırken mevcut şikayetler geçici bir süre için artabilir (ilk kötüleşme). Bu durumda ilacı bırakmalı ve doktorunuzla görüşmelisiniz. Eğer bahsi geçen yan etkilerden biri sizi çok olumsuz etkilerse ya da bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuza veya eczacınıza bilgilendiriniz.

Yan etkilerin bildirilmesi

Eğer yan etkiler ile karşılaşırsanız, doktorunuza veya eczacınıza bilgilendiriniz. Bu husus bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen yan etkiler için de geçerlidir. Yan etkileri kendiniz de doğrudan aşağıdaki kuruma bildirebilirsiniz. Yan etkileri bildirerek, ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi elde edilmesine katkı sağlıyorsunuz.

Bundesanstalt für Arzneimittel und Medizinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3
53175 Bonn
www.bfarm.de/DE/Pharmakovigilanz/form/functions/formpv-node.html

5. Meditonsin® Damla'nın saklanması

Meditonsin® Damla'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Etiketin ve dış ambalajın üzerinde yazan "son kullanma tarihi"nden sonra Meditonsin® Damla'yı kullanmayınız. Son kullanma tarihi belirtilen ayın son günüdür.

Saklama koşulları

Bu ilaç için özel saklama koşulları belirtilmemiştir.

Kutu açıldıktan sonra raf ömrü

Kutuyu açtıktan sonra Meditonsin® Damla'yı 6 aydan daha fazla kullanmayınız ve 25°C'nin üzerinde saklamayınız.

İlaçları, kanalizasyona veya ev çöpüne atmayınız. Artık kullanmadığınız ilaçların nasıl giderilmesi gerektiğini eczacınıza sorunuz. Bu sayede, çevreyi korumaya yardımcı olursunuz.

6. Ambalaj içeriği ve diğer bilgiler

Meditonsin® Damla'nın içeriği:

Etken maddeler:

10 g karışım (19 damla/g) şunları içerir:

Aconitum Dil. D5 (HAB, T. 5a)	1 g
Atropinum sulfurosum Dil. D5	5 g
Mercurius cyanatus Dil. D8	4 g

D3'ten itibaren Aconitinum, D3'ten itibaren Atropinum sulfurosum ve D5'ten itibaren Mercurius cyanatus'un her biri %94 etanol (G/G)/ %85 gliserol/ saf su (5:10:85) karışımıyla güçlendirilmiştir

Meditonsin® Damla'nın görünümü ve ambalaj içeriği:

Berrak, renksiz karışım

Orijinal ambalaj 35 g/ 50 g/ 70 g/ 100 g (2 x 50 g) karışım içerir.

Farmasötik firma ve üretici

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhloweg 37, D-58638 Iserlohn, Almanya
Telefon: 02371/937-0, Faks: 02371/937-329, www.medice.de, e-posta: info@medice.de

Bu kullanma talimatı en son Ekim 2013 tarihinde güncellenmiştir.

403000397503