

Meditonsin

GOTAS

GOTAS

Mezcla

Para uso en lactantes mayores de 7 meses, niños y adultos

Ingredientes activos: Aconitinum D5, Atropinum sulfuricum D5 y Mercurius cyanatus D8

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 3 días.

Contenido del prospecto:

1. Qué son Meditonsin[®] Gotas y para qué se utilizan
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Meditonsin[®] Gotas
3. Cómo tomar Meditonsin[®] Gotas
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Meditonsin[®] Gotas
6. Contenido del envase e información adicional

1. QUÉ SON MEDITONSIN[®] GOTAS Y PARA QUÉ SE UTILIZAN

Meditonsin[®] Gotas son un medicamento homeopático para el tratamiento del resfriado.

Áreas de uso

Las áreas de uso se deducen de los cuadros de los medicamentos homeopáticos. A estas pertenecen: inflamación aguda de la garganta, nariz y faringe.

Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 3 días.

2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A TOMAR MEDITONSIN[®]

GOTAS

No tome Meditonsin[®] Gotas

- si es alérgico a Aconitinum Dil. D5, Atropinum sulfuricum Dil. D5 o Mercurius cyanatus Dil. D8.
- si es alcohólico (Meditonsin[®] Gotas contiene un 6% vol. de alcohol)

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Meditonsin[®] Gotas.

No se dispone de suficiente experiencia documentada acerca del uso de este medicamento en lactantes menores de 7 meses. Por esta razón no se deberá administrar a este grupo de pacientes. En lactantes de 7 a 12 meses solo se deberá administrar Meditonsin[®] Gotas después de la consulta con un médico.

Consulte a su médico en caso de molestias persistentes, indefinidas o nuevas, así como en caso de problemas respiratorios o fiebre.

Toma de Meditonsin[®] Gotas con otros medicamentos

Comuníquese a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento. No hay interacción conocida con otros medicamentos.

Toma de Meditonsin[®] Gotas con alimentos, bebidas y alcohol

El efecto de los medicamentos homeopáticos puede verse afectado negativamente por factores generalmente perjudiciales en el estilo de vida y por sustancias irritantes y estimulantes.

Embarazo, lactancia y fertilidad

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Conducción y uso de máquinas

Meditonsin[®] Gotas no tienen ninguna influencia en la capacidad de conducir ni en el manejo de maquinaria.

3. CÓMO TOMAR MEDITONSIN[®] GOTAS

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda pregunte a su médico o farmacéutico.

Para adultos y niños a partir de 12 años: en caso de cuadros agudos, los adultos y niños a partir de 12 años deberán tomar 5 gotas cada media a una

hora un máximo seis veces al día.

Los niños de 7 meses a 1 año deberán tomar 1 gota cuatro veces al día después de consultar al médico.

Los niños a partir de un año deberán tomar 1 gota como máximo 6 veces al día.

Los niños de 6 a 12 años deberán tomar entre 1 y 2 gotas seis veces al día (como máximo 11 gotas al día).

Vía de administración

Las gotas se deben tomar sin diluir y se deben dejar un tiempo en la boca. El medicamento se toma sin alimentos.

Duración del tratamiento

Se debe comenzar la administración de Meditonsin[®] Gotas lo antes posible.

La administración podrá ser superior a una semana sólo después de la consulta con un médico o un terapeuta con experiencia en homeopatía.

Por favor informe a su médico o farmacéutico si tiene la impresión de que el efecto de Meditonsin[®] Gotas es muy fuerte o muy suave.

Si toma más Meditonsin[®] Gotas del que debe

En caso de sobredosis accidental del medicamento puede experimentar náuseas, vómitos y diarrea debido a sus componentes. En este caso acuda inmediatamente al médico.

Si olvidó tomar Meditonsin[®] Gotas

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas; continúe con la administración de las gotas de la manera anteriormente indicada.

Si interrumpe la toma de Meditonsin[®] Gotas

Es posible que reaparezcan los síntomas. Si tiene cualquier otra duda sobre el uso del medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Posibles efectos adversos

Después del uso de Meditonsin[®] Gotas se puede manifestar exceso de salivación, si es así, suspender el medicamento.

Se pueden manifestar reacciones de hipersensibilidad (por ejemplo, picor y erupción cutánea), si es así, suspender el medicamento.

Indicación: Cuando se toman medicamentos homeopáticos se puede producir un empeoramiento transitorio de las molestias. En este caso se debe suspender el medicamento y consultar a su médico.

Por favor informe a su médico o farmacéutico si considera que alguno de los efectos adversos que experimenta es grave, o si experimenta efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

También puede comunicarlos directamente (véase abajo). Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3
53175 Bonn

www.bfarm.de/DE/Pharmakovigilanz/form/functions/formpv-node.html

5. CONSERVACIÓN DE MEDITONSIN[®] GOTAS

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta y en la caja después de "CAD:". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Condiciones de almacenamiento

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.

Caducidad después de su apertura

Meditonsin[®] Gotas no se deben usar si han transcurrido más de 6 meses desde su apertura y no se deben conservar a más de 25 ° C.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL

Composición de Meditonsin[®] Gotas:

Los principios activos son:

10 g de mezcla (19 gotas/g) contienen:

Aconitinum Dil. D5 (HAB,V.5a) 1 g

Atropinum sulfuricum Dil. D5 5 g

Mercurius cyanatus Dil. D8 4 g

Aconitinum a partir de D3, Atropinum sulfuricum a partir de D3 y Mercurius cyanatus a partir de D5, cada una de las sustancias potencializadas con una mezcla de etanol 94% (g/g)/glicerol 85%/agua purificada (5:10:85)

Aspecto de Meditonsin[®] Gotas y contenido del envase:

Mezcla transparente e incolora.

El envase original contiene 35 g/ 70 g/ 100 g (2 x 50 g) de mezcla

Titular y fabricante:

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG. Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn,
Teléfono: +492371/937-0, Fax: +492371/937-329,
www.medice.de, e-mail: info@medice.de

**Este prospecto fue revisado por última vez en octubre de
2013.**

4030003975
03