



### **Hinweise zur Beendigung der Behandlung mit Philla® 5 mg, 10 mg bzw. 20 mg Tabletten**

Um die unüberwachte Absetzung des Arzneimittels zu vermeiden, ist mit dem Patienten routinemäßig über die Durchführung eines behandlungsfreien Zeitraums zur Probe zu sprechen. Die regelmäßige Beurteilung und Überwachung des Verhaltens mittels formeller Rating-Instrumente scheint die Rate unüberwachter Absetzungen zu verringern.

Nach langjähriger Anwendung ist es sinnvoll, Kindern und Jugendlichen, deren ADHS-Symptome und Ziel-Verhaltensweisen sich stabil gebessert haben, eine behandlungsfreie Probezeit anzubieten, um herauszufinden, ob die medikamentöse Behandlung noch erforderlich ist. Ein solcher Versuch soll unter engmaschiger Überwachung der zentralen Symptome und Funktionsmerkmale im heimischen, schulischen und sozialen Umfeld durchgeführt werden.

Nach Absetzung von Dexamfetamin ist eine sorgfältige Überwachung erforderlich, da es zur Demaskierung von Depressionen oder von chronischer Hyperaktivität kommen kann.

Bei einigen Patienten kann eine langfristige Nachbeobachtung erforderlich sein.

Wenn Sie Fragen zu diesem Arzneimittel haben, wenden Sie sich bitte an MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH.

Telefon: +43 (0) 800 297534

E-Mail: [info@medice.at](mailto:info@medice.at)